1-Vérifier **la concordance** entre les **analyses demandées** et le **choix des tubes**. Consulter le manuel de prélèvement et / ou guide d'utilisation du bon de prescription disponibles sur kaliweb.

2-Vérifier **l'identité du patient** par une question ouverte chaque fois que possible

3-Choix du site de ponction : **ne pas prélever sur bras perfusé**, **éviter le prélèvement sur cathéter**.

4-Préparation du plateau : le choix du piquant est fait en fonction de l'état des veines du patient, **privilégier la ponction franche.**

5-Respecter l'ordre de prélèvement des tubes.

6-Respecter le volume de remplissage des tubes.





7-Homogénéisation par 5 à 10 retournements lents **immédiats**.

8-Etiqueter correctement les tubes **au chevet du patient. LE PRE-ETIQUETAGE DES TUBES EST FORMELLEMENT PROSCRIT au regard des risques d'identito-vigilance qu'il présente.**

9-Indiquer **l'heure et la date du prélèvement, le nom du préleveur (en toutes lettres et lisiblement) et du prescripteur (en toutes lettres et lisiblement)** sur le bon de demande d'analyse.

10-Indiquer les **renseignements cliniques pertinents** (traitement, saignements, date des dernières règles, etc....)

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI

ORDRE DE PRELEVEMENT DES TUBES

Recommandations CSLI 5NCCLS° Doc H3-A6 2007 et GFHT 2015

Choix du dispositif

Tube de purge

Citrate de sodium
Hémostase

Sérum avec activateur de coagulation

Héparine Lithium

EDTA

Fluorure de sodium

Il est de la responsabilité du préleveur de vérifier les dates de péremption du matériel piquant et des dispositifs de prélèvement.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI