Laboratoire CH de Paimpol
36, Chemin de Kerpuns
22500 Paimpol

Choix des contenants pour prélèvements biologiques

PL-C-MOP-016
Version : 1
Applicable le : 01-06-2023

RECIPIENT A UTILISER EN FONCTION DES EXAMENS DEMANDES.

Tout défaut de quantité peut empêcher la réalisation des examens demandés et entraine l'émission d'un fiche d'évènement indésirable.

Flacon à ECBU 60mL + conservateur — Flacon stérile 60mL — Tube héparine avec gel séparateur — Tube citraté pédiatrique ou adulte
Flacon stérile 2 L — Pot à coproculture (160 mL) — Ecouvillon + Milieu de transport
Ecouvillon+milieu de transport virus — aspiration nasopharyngée (pharmacie)

BACTERIOLOGIE et MYCOLOGIE

URINES : ▯ **E.C.B.U.** (QSP : 5mL) (ou si faible volume et transmission dans l'heure au laboratoire)

▯ Cytochimie urinaire seule : protéines, leucocytes, glucose, nitrites (QSP : 5mL)

▯ Compte d'ADDIS

▯ Antigènes de *Legionella pneumophila (Légionelle)* ou (QSP : 5mL)

▯ Antigènes de *Streptococcus pneumoniae (pneumocoque)* ou (QSP : 5mL)

} ou Si demandés ensembles

SELLES : ▯ **COPROCULTURE (recherche de bactéries entéropathogènes)**
▯ Ag et toxines A&B de *Clostridium difficile*
▯ Recherche de sang dans les selles (saignement occulte)

POT A COPROCULTURE (160 mL)

▯ **HEMOCULTURE** : aérobie (bleu) anaérobie (violet) pédiatrique (rose)
1 prélèvement unique de **2 à 3 couples maximum par 24 heures**, de préférence au pic thermique
(QSP : 8 à 10mL pour les flacons standards, 1 à 3mL pour les flacons pédiatriques)

▯ **LCR** (QSP 4X 1mL)

Liquide de PONCTION : (QSP 1mL) ⚠ Liquide articulaire : + transférer un peu de liquide dans un tube supplémentaire

CATHETER :

Prélèvement ORL : ou ou

Prélèvement pulmonaire :

Recherche de B.K :

Site OPERATOIRE : ou **SERINGUE (collection fermée)**

Site CUTANE : ou ou **PRELEVEMENTS DE PHANERES**

Prélèvement GENITAUX : DEUX ECOUVILLONS

▯ Mycoplasmes uro-génitaux (culture)
▯ *C. trachomatis* (cocher : *culture / PCR / frottis*)
▯ Herpès virus 1& 2 (cocher : *culture / PCR / frottis*)

} **ECOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT SPECIFIQUE**
Appel au laboratoire avant le prélèvement

PUS : **ou** **ou SERINGUE**

VIROLOGIE

Prélèvement ORL : ▯ Ag virus grippaux
▯ VRS

(Commande dispositif à la pharmacie)

Hors site PAIMPOL écouvillonnage nasal avec milieu de transport virus

SELLES : **POT A COPROCULTURE (160 mL)**

PARASITOLOGIE

SELLES : **POT A COPROCULTURE (160 mL)**

BIOCHIMIE et TOXICOLOGIE des URINES

URINES DES 24 heures :

ou ▯ échantillon (QSP : 5mL)

▯ Na – K
▯ Calciurie
▯ Phospaturie
▯ Urée urinaire
▯ Créatininurie
▯ Uraturie

▯ Protéinurie des 24h

▯ Protéinurie
▯ Glucosurie
▯ Nitrites
▯ Leucocytes

▯ Microalbuminurie

▯ Recherche de toxiques et métabolites urinaires

▯ Clairance à la créatinine +

(joindre un tube de sang hépariné avec gel séparateur)

Recherche de Bactéries Multi-Résistantes (BMR)

▯ **S. Aureus Résistant à la Méticilline (SARM)** :
-1 écouvillonnage des deux fosses nasales

▯ **Entérobactéries productrices de Bétalactamse à Spectre Etendue (BLSE)** :
- prélèvement de selles (ou écouvillonnage rectal)

ou

▯ **Entérocoques Résistants aux Glycopeptides (vancomycine, teicoplanine) (ERG)** :
- prélèvement de selles (ou écouvillonnage rectal)

ou

▯ **Entérobactéries Productrices de Carbapénèmase (EPC)**
- prélèvement de selles (ou écouvillonnage rectal)

ou

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI